

CLINICA GINECOLOGICA TOCO-GYN, S.L.

PRECAUCIONES A SEGUIR DESPUÉS DE REALIZAR UNA AMNIOCENTESIS

- Permanecer en la sala de espera después de la punción durante 15 a 20 minutos por si aparecen mareos, pérdidas de sangre o de líquido amniótico por la vagina.
- Tratamiento: PROGESTERONA (Progeffik® o Utrogestan ® de 200 mg). 1 comp /día vía vaginal excepto el 1º comprimido que se toma vía oral. Durante 7 días.
- Tener en cuenta que si el grupo materno es RH negativo, debe aplicarse la gammaglobulina anti-D dentro de las 72 horas después de la amniocentesis.
- Mantener reposo relativo durante 2 a 4 días (no cargar peso, no hacer esfuerzos y procurar no estar más de una hora de pie). Los 2 primeros días es conveniente que permanezca en casa ya que es cuando el riesgo de aborto es mayor.
- Durante todo este tiempo conviene prestar especial atención a :
 - Pérdida de líquido por la vagina,
 - Pérdida de sangre por la vagina,
 - Contracciones uterinas mantenidas, dolorosas o no.

Si algo de todo esto ocurriera acudirá al Servicio de Urgencias de Maternidad del Hospital o a la clínica con los informes que se le hayan dado.